ETYKIETO-ULOTKA
(OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO)

TABLETKI TONIZUJĄCE LABOFARM®
20 tabletek

Skład tabletki:
kwiatostan głogu - 150 mg
owoc głogu - 30 mg
ziele serdecznika - 100 mg
ziele nostrzyka - 40 mg

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki.
Jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.
Pozwolenie nr: R/2751
Nr serii:
Termin ważn.:
Kod EAN UCC 5909990275113

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

TABLETKI TONIZUJĄCE LABOFARM®
tabletka
20 tabletek

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie jako lek wspomagający pracę serca i układu krążenia (w przypadku braku obrzęków, zwłaszcza w okolicy kończyn dolnych, oraz kiedy stosowanie innych leków nie jest konieczne).
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować z lekami obniżającymi krzepliwość krwi oraz u pacjentów z chorobami wątroby.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:
Możliwość przyjmowania z innymi lekami stosowanymi w chorobach układu krążenia oraz w przypadku tachykardii (częstoskurczu) należy skonsultować z lekarzem. W przypadku bólu w okolicy serca promieniującego w kierunku ramion, bólu w górnej części jamy brzusznej, w okolicy szyi, obrzęków (zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych) oraz wystąpienia duszności, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli objawy nie ustąpią w czasie stosowania produktu, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:
Preparat może wywoływać interakcje z lekami przeciwkrzepliwymi.

Ostrzeżenia specjalne:
Stosowanie u dzieci:
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
Ciąża i karmienie piersią:
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia.
Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:
Nie ma wpływu.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:
Doustnie. Dorośli: 2 tabletki 2-3 razy dziennie przed jedzeniem.
Nie przekraczać dawki dobowej 6 tabletek, co odpowiada ilości do 3 mg kumaryn na dobę. Nie stosować przez dłuższy okres czasu bez konsultacji z lekarzem.

Przedawkowanie:
Objawami przedawkowania mogą być nudności, wymioty, bóle głowy. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:
Możliwe jest wystąpienie dolegliwości żołądkowo-jelitowych i reakcji alergicznych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych oraz działań niepożądanych, niewymienionych w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie leku:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności.

Skład leku:
Crataegi folium cum flore - 150 mg
Crataegi fructus - 30 mg
Leonuri cardiacae herba - 100 mg
Meliloti herba - 40 mg
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jedna tabletka zawiera 0,02-0,5 mg kumaryn i nie mniej niż 1,25 mg flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
fax 58 561 20 16
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:
Labofarm
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: