ETYKIETO-ULOTKA
OZNAKOWANIE OPAKOWANIA BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

HYPERHERBA®
Hyperici herba
330 mg, tabletka
20 tabletek
Skład tabletki:
ziele dziurawca - 330 mg
Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania leku lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki
Pozwolenie nr: 4731
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza.
Nr serii:
Termin ważn.:
Kod EAN UCC: 5909990473113
Informacja w systemie Braille'a: Hyperherba

INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

HYPERHERBA®
Hyperici herba
330 mg, tabletka

20 tabletek

Wskazania do stosowania:
Tradycyjnie stosowany w celu łagodzenia występujących przejściowo objawów wyczerpania psychicznego.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Przeciwwskazania:
Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ziele dziurawca.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:
Przyjmowanie preparatów z dziurawca może powodować uczulenie na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji skóry, dlatego nie zaleca się bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne w czasie stosowania preparatu.
Jeżeli objawy utrzymują się po 2 tygodniach stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji:
Dane literaturowe wskazują, że przyjmowanie preparatów z ziela dziurawca może powodować osłabienie działania niektórych leków. Z tego względu nie należy stosować leku z warfaryną, cyklosporyną, teofiliną, digoksyną. Możliwe jest również osłabienie działania doustnych środków antykoncepcyjnych. Podczas leczenia zakażeń wirusem HIV środkami przeciwwirusowymi wyciągi z ziela dziurawca powodują obniżenie ich stężenia (np. indinaviru) w osoczu.
Nie zaleca się stosowania preparatów z ziela dziurawca bez konsultacji z lekarzem łącznie ze środkami przeciwdepresyjnymi, które hamują wychwyt zwrotny serotoniny.

Ostrzeżenia specjalne:
Stosowanie u dzieci:
Nie zaleca się stosowania leku poniżej 18 roku życia.
Ciąża i karmienie piersią:
Z powodu braku wystarczających danych stosowanie w okresie ciąży i laktacji nie jest zalecane.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn:
Nieznany wpływ.

Dawkowanie, sposób stosowania i droga podania:
Doustnie, dorośli: 1 tabletkę 3 razy dziennie przez okres dwóch tygodni. Preparat popić wystarczającą ilością wody.

Przedawkowanie:
Po znacznym przedawkowaniu, pacjent powinien być chroniony przez działaniem promieni słonecznych i innych źródeł światła UV przez okres 1-2 tygodni.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:
Mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe, skórne reakcje alergiczne, zmęczenie i niepokój. Osoby o jasnej karnacji, po ekspozycji na intensywne światło słoneczne, mogą reagować nasilonymi objawami imitującymi oparzenia słoneczne. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie leku:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności.

Skład leku:
Hyperici herba - 330 mg
Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.
Jedna tabletka zawiera nie mniej niż 0,2 mg hiperycyn.

Podmiot odpowiedzialny:
Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.
tel. 58 561 20 08
e-mail: poczta@labofarm.com.pl

Wytwórca:
Labofarm
ul. Lubichowska 176 b
83-200 Starogard Gd.

Data zatwierdzenia tekstu ulotki: